

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen

Hôpitaux de Rouen

Service de Néphrologie, Dialyse, Transplantation Rénale,
Hypertension artérielle, Lithiase Rénale & Unité de Surveillance Continue

INFORMATION A L'ATTENTION DES PATIENTS TRANSPLANTES RENAUX SUIVIS AU CHU DE ROUEN

Rouen, le 28/01/2022

Madame, Monsieur,

Les dernières recommandations du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale préconisent une deuxième dose de rappel 3 mois après la première chez les patients immunodéprimés. Il s'agit donc pour vous d'une **5^{ème} dose, à réaliser 3 mois après la 4^{ème} dose**. L'administration de cette 5^{ème} dose se fera en fonction de votre **taux d'anticorps 3 mois après la 4^{ème} dose**.

Cette 5^{ème} dose doit se faire dans l'idéal avec le vaccin **MODERNA 100µg**, ou à défaut Pfizer.

Si vous n'avez pas répondu aux premières doses de vaccin et avez donc reçu des anticorps monoclonaux, vous n'êtes pas concernés par cette 5^{ème} dose.

En pratique :

- Si votre sérologie était > 260 BAU/ml après la 4^{ème} dose, vous devez faire contrôler cette même sérologie 3 mois après la 4^{ème} dose et nous tenir informés des résultats. Nous déterminerons si la 5^{ème} dose est nécessaire pour vous.
- Si votre sérologie était < 260 BAU/ml après la 4^{ème} dose et que vous avez reçu des anticorps monoclonaux, vous n'êtes pas concernés par cette 5^{ème} dose.
- Si votre sérologie était < 260 BAU/ml après la 4^{ème} dose mais que vous n'avez pas reçu d'anticorps monoclonaux (contre-indication), vous devez réaliser cette 5^{ème} dose 3 mois après la 4^{ème} sans nécessité de contrôler les anticorps au préalable.

Bien cordialement,

Votre équipe de transplantation rénale,